

**Livret des Abstracts 35ème Congrès  
SARAF- CICB Bamako 106**

**Les complications post-opératoires  
de la rachianesthésie au centre de  
santé de référence de la commune  
V du District de Bamako.**

**COULIBALY Y1, KONÉ J1, KONATÉ  
M1, TRAORÉ N1, DIARRA B1, KOITA  
A1, DIALLO B2, THIAM A2.**

**1-SERVICE D'ANESTHÉSIE**

**RÉANIMATION- CSREF CV BAMAKO**

**2- DÉPARTEMENT D'ANESTHÉSIE**

**RÉANIMATION URGENCES- CHU DU  
POINT G.**

# Introduction :

LA RACHIANESTHÉSIE EST LA TECHNIQUE LA PLUS UTILISÉE EN MILIEU OBSTÉTRICAL ET GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE. EN POST OPÉRATOIRE, CERTAINES COMPLICATIONS PEUVENT ÊTRE OBSERVÉES NOTAMMENT LES CÉPHALÉES ET LES CERVICALGIES. NOUS AVONS RÉALISÉ CETTE ÉTUDE DONT L'OBJECTIF ÉTAIT D'EN ÉTUDIER LES PRINCIPALES COMPLICATIONS.

# Patientes et méthode :

IL S'AGISSAIT D'UNE ÉTUDE PROSPECTIVE RÉALISÉE SUR 03 MOIS AU CSREF DE LA COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO, DANS LAQUELLE ONT ÉTÉ INCLUES LES PATIENTES ÂGÉES D'AU MOINS 15 ANS AYANT BÉNÉFICIÉ D'UNE RACHIANESTHÉSIE, À L'EXCLUSION DES CAS D'ÉCHEC. LE RECUEIL DES DONNÉES A ÉTÉ RÉALISÉ DÈS L'INCLUSION À LA CONSULTATION D'ANESTHÉSIE, ET JUSQUE DANS LES 10 JOURS EN POST-OPÉRATOIRE.

## Patientes et méthode :

L'ANALYSE DES DONNÉES  
RECUEILLIES PAR INTERVIEW DIRECTE  
AVEC LES PATIENTES ET LA MESURE  
DES PARAMÈTRES CLINIQUES, A ÉTÉ  
FAITE AVEC LE LOGICIEL SPSS, ET  
EXPRIMÉS EN EFFECTIFS ET  
POURCENTAGES.

# Résultats :

NOUS AVONS ENREGISTRÉS 40 PATIENTES ÂGÉES DE 25 À 35 ANS, CLASSÉES ASA I (12 CAS), ASAII (26CAS) ET ASAIII (2 CAS) ; DONT 65,5% ÉTAIENT DES MÉNAGÈRES. LA CÉSARIENNE REPRÉSENTAIT 97,5% DES ACTES CHIRURGICAUX, PRISES EN URGENCE DONT 70% DES CAS ÉTAIENT PROGRAMMÉES. LA RACHIANESTHÉSIE A ÉTÉ FAITE AVEC DE LA BUPIVACAÏNE 0,5% SEULE, APRÈS UNE PONCTION À L'AIGUILLE DE TYPE QUINCKE DE TAILLES 24 ET 25GAUGE.

## Résultats :


LES COMPLICATIONS POST-OPÉRATOIRES ÉTAIENT : CÉPHALÉES 45,83%, DORSALGIES 8,33% ; CERVICALGIES (41,66%) AVEC 2 CAS DE NVPO ET 1 CAS DE DOULEUR PERSISTANTE AU POINT D'INJECTION. LA PRISE EN CHARGE A ÉTÉ FAITE AVEC LE PARACÉTAMOL PAR VOIE ORALE ET INTRAVEINEUSE PLUS, LES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STÉROÏDIENS (AINS). L'ÉVOLUTION ÉTAIT MARQUÉE PAR UNE DISPARITION TOTALE DE LA SYMPTOMATOLOGIE AU BOUT DE 48 HEURES EN POST-OPÉRATOIRE. LA DURÉE MOYENNE D'HOSPITALISATION ÉTAIT DE 3 JOURS.

## Conclusion :

LA RACHIANESTHÉSIE EST UNE TECHNIQUE SIMPLE ET EFFICACE. TOUTEFOIS LES COMPLICATIONS POSTOPÉRATOIRES SONT À PRENDRE EN COMPTE DONT LES PRINCIPALES SONT LES CÉPHALÉES AUXQUELLES IL FAUT ASSOCIER DES CERVICALGIES D'ÉVOLUTION FAVORABLE SOUS TRAITEMENT À BASE DE PARACÉTAMOL ET D'ANTI-INFLAMMATOIRE NON STÉROÏDIEN.

**Mots clés :**

**RACHIANESTHÉSIE,  
CÉPHALÉES,  
CERVICALGIES.**





**MERCI**

**POUR VOTRE AIMABLE  
ATTENTION**